

Tratamiento de las neurosis ansiosas y depresivas con un nuevo psicofármaco: Nomifensin

H. CHAPPA *

E. LEVIN **

J. MOIZESZOWICZ *

Se estudió el efecto del maleato ácido de 8-amino-2-metil-4-fenil,1,2,3,4,tetra-hidroisoquinolina (Nomifensin) —nuevo psicofármaco no encuadrado dentro de los grupos tricíclicos ni de los IMAO—, en distintos cuadros depresivos y ansiosos. La muestra comprendió 33 pacientes, estudiados durante cinco semanas. Se empleó para el seguimiento la escala de clasificación psiquiátrica de Wittenborn, la escala de depresión de Hamilton, la escala de autoadministración de Zung y el inventario PEN de Eysenck. El Nomifensin se empleó como droga única, en cápsulas de 25 mg, siendo la dosis media de 67 mg/día (rango: 25 mg - 100 mg/día).

Los cambios en las escalas de Hamilton y Zung son estadísticamente significativos respecto del pretratamiento a partir de la primera semana. En el inventario PEN solamente la escala N mostró diferencias significativas antes-después. Se efectúa un comentario sobre la correlación de $r = 0.63$ obtenida entre las escalas de Zung y Hamilton. Se comprobó que el psicofármaco posee una acción timoléptica dentro de la primera semana con una acción adicional sobre los síntomas de ansiedad, comúnmente asociados en las depresiones reactivas.